

## แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ที่สำคัญได้แก่ ตุ่มน้ำ บ่อคอนกรีตในท้องน้ำ แจกัน จานรองขาตู้ ภาชนะพรวน้ำ ฯลฯ

วิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์โดย :

- ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด



- ใส่ทรายอะเบท/ เกล็ดเอชวาย-เอส เอส/ ปลากินลูกน้ำ/ จุลินทรีย์/ ตัวเนียง/ มวน



- เปลี่ยนน้ำในแจกันทุก 5 วัน
- ใส่ดินปลูกต้นไม้หรือปิดไม้ให้น้ำขังในยางรถยนต์
- ควรทำการฝังหรือเผาเศษขยะเพื่อไม่ให้มีน้ำขัง

## ร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย



- กำจัดลูกน้ำยุงลายทุก 5 วันเป็นประจำ
- ป้องกันไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
- ปรับปรุงบ้าน บริเวณบ้านให้สะอาด ปราศจากวัสดุเหลือใช้
- ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมสำรวจหรือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

## วิธีการป้องกันยุงลายกัก และโรคไข้เลือดออก

- กางมุ้งทุกครั้งที่ได้กนอน



- ใช้สารทาป้องกันยุง/ เครื่องไล่ยุงไฟฟ้า/ ยาจุดกันยุง



- ระวัง อย่าให้ยุงกัดโดยเฉพาะในเวลากลางวัน โดยใช้น้ำใส่สูงไฟฟ้าหรือใช้มือตบกำจัดยุง



- ฉีบทันสารกำจัดยุง

- ป้องกันไม่ให้มีลูกน้ำยุงลาย ทั้งภายในและนอกบ้าน



## ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก



ด้วยความปรารถนาดีจาก  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ



## ชุมชนร่วมใจ กำกับยุงลายเลือกออก

- เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน เพื่อจะได้รู้วิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และวิธีป้องกันไม่ให้ยุงกัด
- รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง



## โรคไข้เลือดออก



- เป็นโรคติดต่ออันตราย มียุงลายเป็นตัวนำเชื้อไวรัส
- เกิดในทุกเพศ ทุกวัย ส่วนใหญ่พบในเด็ก
- พบทุกพื้นที่ในประเทศไทย ระบาดมากในฤดูฝน
- รักษาไม่ทันอาจเสียชีวิต
- สามารถป้องกันโรคนี้ได้โดยการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และ แหล่งเพาะพันธุ์

## โรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นได้อย่างไร



- เกิดหลังจากถูกยุงลายที่มีเชื้อไวรัสกัด 1 สัปดาห์ และเด็กขาดภูมิคุ้มกันโรค
- ขณะนี้ยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสไข้เลือดออก แพทย์จะให้การรักษาตามอาการ

## ยุงลายเป็นพาหะไข้เลือดออกได้อย่างไร



วงจรชีวิต ประมาณ 9-14 วัน  
เมื่อยุงไปกัดเด็กที่มีเชื้อไวรัสไข้เลือดออก จะกลายเป็นยุงพาหะ แพร่เชื้อได้ตลอดชีวิต

## เมื่อไรควรไปพบแพทย์

1. มีไข้สูงกระตุบหั่น อาเจียน  
รับประทานอาหารไม่ได้ ตับโต  
เจ็บหน้าอก อาจจะมีเลือดกำเดาออก
2. รับประทานยาลดไข้ แล้วไข้ไม่ลด  
อ่อนเพลียมาก



## การดูแลรักษาเบื้องต้น



- เมื่อไข้สูงให้เช็ดตัว
- ให้อาหารอ่อน
- ห้ามใช้ยาแอสไพริน



- ให้ดื่มนม/ ผงเกลือแร่/  
น้ำผลไม้ แก้อ่อนเพลีย

- อาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน รีบไปโรงพยาบาล โดยด่วน เพราะการรักษาที่ถูกต้อง จะป้องกันการช็อกและเสียชีวิต จากโรคนี้

